

Acker-Schöterich

Erysimum cheiranthoides

Brassicaceae · Erysimum · Brassicales · Magnoliopsida



ÜBER DIE PFLANZE

Einjähriges Kraut, 15-100 cm (selten bis 150 cm) hoch.

WIRKUNG

entzündungshemmend, schleimlösend, adstringierend

ANWENDUNG

innere Anwendung (Tinktur, Teekur), äußere Anwendung (Tinkturen oder Umschläge bei Ekzemen oder Neurodermitis)

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Husten und Bronchitis, Entzündungen, Magen-Darm-Beschwerden, Hauterkrankungen, Wundheilung

ERKENNUNGSMERKMALE

Gelbe Blüten (5-12 mm Durchmesser) in aufrechten Blütenständen; schlanker, zylindrischer Schötchen (1-3 cm lang, selten bis 5 cm)

WUCHS

aufrecht, aufsteigend, spreizend

BLÜTEZEIT

- Juni bis August

STANDORT

gestörte Flächen, Felder, trockene Flussbetten (0-3.000 m Höhe)

HERKUNFT

Europa und Asien

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Frisches Kraut, Samen und Wurzeln werden verwendet

ZUBEREITUNG

- Tinktur
- Teekur
- Salben

ERNTEZEIT

-
- Teil: Blüte|Blatt · Monate: [6, 7, 8] · Hinweis: ...

SAMMELN

- Monate: [6, 7] · Hinweis: Traditionell zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Insektenstichen. · Bedingungen: Vorsichtig abschneiden, um die Pflanze nicht zu beschädigen. · Pflanzenteil: Blüte · Reifezustand: reif
- Monate: [6, 7] · Hinweis: Traditionell zur Behandlung von Husten und Bronchitis. · Bedingungen: Ernten, wenn die Pflanze aktiv wächst (nicht zu alt). · Pflanzenteil: Blatt · Reifezustand: vor Reife|Knospe
- Monate: [6, 7] · Hinweis: Traditionell zur Behandlung von Magenwürmern. · Bedingungen: Ernten, wenn die Schoten braun und trocken sind (vor dem Öffnen). · Pflanzenteil: Samen · Reifezustand: überreif
- Pflanzenteil: Wurzel

INHALTSSTOFFE

- Glucosinolate
- Cardenolide (Herzglykoside)
- Saponine
- Alkaloide

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

GEGENANZEIGEN

kann mit blutverdünnenden Medikamenten wechselwirken

WECHSELWIRKUNGEN

kann mit blutverdünnenden Medikamenten (z. B. Marcumar) wechselwirken