

Silberimmortelle

Anaphalis margaritacea

Asteraceae · Anaphalis · Asterales · Magnoliopsida

ÜBER DIE PFLANZE

Eine Perennialpflanze aus der Familie der Asteraceae. Sie wächst bis zu 90 cm hoch und hat pearly white bracts, die den Namen des Pflanzens verleihen.

ANWENDUNG

Verwendet zur Behandlung von Verbrennungen, Erkältungen, Husten, Durchfall, Ruhr, Asthma, Wunden und Schwellungen.

ÜBERLIEFERTES WISSEN

Von den Native Americans als Heilkraut und Tabakersatz verwendet. Großmutter nutzte mehr als 500 verschiedene Aufgüsse und Sude, verwendet in ärztlicher Praxis.

ERKENNUNGSMERKMALE

Pearly white bracts, drei oder mehr Kreise von Brakten, haarige Außenseite der Brakten, lineare oder eiförmige Braktenform, flache oder fast flache Blütenschaftprofile, Blütenschaft ohne Bristeln am Basisplatz

WUCHS

Perennial

STANDORT

trockene, sonnige Klima

HERKUNFT

Heimisch in Nordamerika und Asien; weit verbreitet kultivierte Zierpflanze mit vergrößertem Verbreitungsgebiet.

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Pflanze

INHALTSSTOFFE

- tiliroside
- quercetin
- stigmast-5-en-3-ol
- chamomile
- stigmast-5-en-3-ol, (3β)-
- astragalin
- 5-chloro-2-(octa-2,4,6-triyn-1-ylidene)-5,6-dihydropyran
- (2e,5r)-5-chloro-2-(octa-2,4,6-triyn-1-ylidene)-5,6-dihydropyran
- ursolic acid
- trifolin
- pomolic acid
- phytosterol
- araneol
- 4-hydroxy-5,5-dimethyloxolan-2-one
- galangin 3-methyl ether
- (3r,4r)-3,4-dihydroxy-3-methyloxolan-2-one
- amylin
- (4r)-4-hydroxy-5,5-dimethyloxolan-2-one
- β-amylin
- 3,4-dihydroxy-3-methyloxolan-2-one

- lupeol
- (6ar,6br,8ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,12,14b-heptamethyl-11-methylidene-hexadecahydricen-3-ol
- spiraeoside
- taraxasterol
- gnaphaliin
- quercetin 3-methyl ether
- campesterol
- 3,5-dihydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-phenylchromen-4-one
- 5,6-dihydroxy-3,7-dimethoxy-2-phenylchromen-4-one

ÄTHERISCHE ÖLE

- 1,10-dihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,13,14b-tetradecahydricene-4a-carboxylic acid
- ursolic acid
- 10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,13,14b-tetradecahydro-1h-picene-4a-carboxylic acid
- pomolic acid
- amyrin
- 10-(acetyloxy)-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,13,14b-tetradecahydro-1h-picene-4a-carboxylic acid
- 10-(acetyloxy)-1-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,13,14b-tetradecahydricene-4a-carboxylic acid
- (4ar,6ar,6br,8as,12ar,12br,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octamethyl-2,3,4a,5,6,7,8,9,12,12a,12b,13,14,14a-tetradecahydro-1h-picen-3-ol
- β-amyrrin
- lupeol
- (6ar,6br,8ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,12,14b-heptamethyl-11-methylidene-hexadecahydricen-3-ol
- (1s,2r,4as,6as,6br,8ar,10s,12ar,12br,14bs)-10-(acetyloxy)-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,13,14b-tetradecahydro-1h-picene-4a-carboxylic acid
- taraxasterol
- (1r,2r,4as,6as,6br,8ar,10s,12ar,12br,14bs)-10-(acetyloxy)-1-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,13,14b-tetradecahydricene-4a-carboxylic acid

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.