

Gewöhnliche Kuhschelle

Pulsatilla vulgaris

Ranunculaceae · Pulsatilla



SAMMELN

- Monate: [3, 4, 5] · Hinweis: Nektar- und Pollengehalt maximieren · Tageszeit: morgens|mittags · Bedingungen: während der Blütezeit, an bewölkten Tagen · Pflanzenteil: Blüte · Reifezustand: reif
- Monate: [9, 10] · Hinweis: vorsichtig ausgegraben und getrocknet · Bedingungen: nach der Blüte, wenn die Pflanze Ruhephase hat · Pflanzenteil: Wurzel
- Monate: [3] · Bedingungen: im Frühjahr, wenn sie frisch und kräftig sind · Pflanzenteil: Blatt

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

mittel

GIFTIGE TEILE

- alle Pflanzenteile

VERGIFTUNGSZEICHEN

Blasenbildung, Verätzungen und Entzündung der betroffenen Hautstellen, Nierenentzündungen, Magen- und Darmbeschwerden sowie Lähmungen des Zentralnervensystems

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

QUELLEN

- Typ: korpus · Datei: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim · Stand: 2026-01-15 · Titel: Gewöhnliche Kuhschelle · Felder: ['giftige_teile', 'vergiftungssymptome'] · Korpus: kiwix · Erfasst: 2026-09-03T07:54:02 · Hinweis: kiwix: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim (Stand 2026-01-15), Artikel «Gewöhnliche Kuhschelle» (gefunden über «Pulsatilla vulgaris») · Sprache: de