

Südseemyrte

Leptospermum scoparium

Myrtaceae · Leptospermum · Myrtales · Magnoliopsida



ÜBER DIE PFLANZE

Die immergrüne Südseemyrte wächst strauch- oder baumförmig bis 6–8 Meter Höhe. Die Zweige und jungen Blätter sind von silbrigen Haaren mehr oder weniger dicht umhüllt, bei den älteren Teilen löst sich die Borke in langen Streifen ab.

WIRKUNG

Zusammenziehend (adstringierend), gegen Durchfall, antibakteriell, antimykotisch, entzündungshemmend, krampflösend, beruhigend, angstlösend, harntreibend, fiebersenkend (innerliche Anwendung); bakterielle und Pilzinfektionen, Wunden, Schnittwunden, Geschwüre (Wundstellen), schlecht heilende Ulzera, Ekzem, entzündliche Hauterkrankungen (äußerliche Anwendung)

VOLKSMEDIZIN IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Hildegard von Bingen vereint griechisch-lateinischen und Volksmedizinwissens in ihren Schriften. Sie beschreibt verschiedene Heilmittel, darunter Kräuter wie Fenchel, Galgant, Bertram, Quendel und Dinkel.

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- magen-darm-beschwerden
- erkrankungen der blase
- erkältungen
- hautkrankheiten
- wunden

ÜBERLIEFERTES WISSEN

- verwendet von den maori für leiden wie magen-darm-beschwerden, erkrankungen der blase,

erkältungen, hautkrankheiten und wunden

- euroepäische botaniker (z.b. joseph banks)

KULTURELLE BEDEUTUNG

Traditionell von den Maori-People für medizinische und praktische Zwecke verwendet

ERKENNUNGSMERKMALE

zweige und junge blätter sind von silbrigen haaren umhüllt, bei älteren teilen löst sich die borke in langen streifen ab

WUCHS

Strauch oder kleiner Baum

BLÜTEZEIT

- Januar bis Juni

STANDORT

Vollsonnig, ideal für Fensterplätze

HERKUNFT

Bergige Regionen von Neuseeland und Norden Australiens

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- blüten, kapseln und samen

SAMMELN

- Tageszeit: morgens · Bedingungen: trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Blüte · Reifezustand: reif

INHALTSSTOFFE

- Tannine, Triterpine Säuren und deren Derivate, Flavonoide, Essenzielles Öl mit hohen Mengen von Cinteole und Monoterpinen

ÄTHERISCHE ÖLE

- terpineol

•

(1s,2r,4as,6as,6br,8ar,10r,11r,12ar,12br,14bs)-11-hydroxy-10-{[(2z)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy}-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,13,14b-tetradecahydro-1h-p icene-4a-carboxylic acid

- geranyl acetate
- platanic acid
- betulin
- 1,1,7-trimethyl-4-methylidene-octahydro-1ah-cyclopropa[e]azulene
- (-)-4-terpineol
- (1ar,4ar,7r,7as,7bs)-1,1,7-trimethyl-4-methylidene-octahydro-1ah-cyclopropa[e]azulene
- terpinolene
- (1s,5r,7s,10r)-7-isopropyl-4,10-dimethyltricyclo[4.4.0.0^{1,5}]dec-3-ene

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.