

Kleb-Drüsengänsefuß

Dysphania botrys

Amaranthaceae · Dysphania · Caryophyllales · Magnoliopsida

ÜBER DIE PFLANZE

Eine faszinierende, aber oft unterschätzte Pflanze mit einer Reihe interessanter Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten.

ANWENDUNG

- Kulinarisch
- Medizinisch
- Praktisch
- Zierpflanze

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Antiasthmatikum
- bei Katarrh eingesetzt
- als Wurmmittel (Anthelminthikum) in der Vergangenheit genutzt

TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN

Hinweise zur vorsicht: ['Konsultation mit Gesundheitsdienstleistern bei Schwangerschaft, Stillzeit oder Behandlung von Kindern', 'Klärung der Qualifikation von TCM-Praktikern (Zertifizierung durch National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine)', 'Nicht als Ersatz für konventionelle Medizin verwenden', 'Vollständige Offenlegung der TCM-Anwendung gegenüber Ärzten']

ÜBERLIEFERTES WISSEN

- Historische Nutzung als Mottenkraut
- Basilius Besler hat die Pflanze in seinem Werk abgebildet

KULTURELLE BEDEUTUNG

- Wurde früher als 'Mottenkraut' bezeichnet und zur Mottenabwehr verwendet
- Basilius Besler hat die Pflanze in seinem berühmten Werk 'Hortus Eystettensis' (1613) abgebildet

ERKENNUNGSMERKMALE

Klebrige, aromatische Blätter und Samen.

BLÜTEZEIT

- Mai bis August

STANDORT

Trockene, sonnige Standorte mit nährstoffarmen Böden.

HERKUNFT

Eurasiatisch

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Blätter
- Samen

INHALTSSTOFFE

- 8-hydroxy-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalen-1-yl acetate
- 2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalene-1,7-diol
- chrysoeriol
- 7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalene-1,2,8-triol
- 2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a,8-dimethyl-6-oxo-1,2,3,4,5,8a-hexahydronaphthalen-1-yl acetate

- (1r,3ar,7r,8ar)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1-methyl-4-methylidene-octahydroazulen-1-ol
- bet
- 2-[(3r,3ar,5s,8ar)-3-hydroxy-3-methyl-8-methylidene-octahydroazulen-5-yl]propan-2-yl acetate
- 2-(3-hydroxy-3-methyl-8-methylidene-octahydroazulen-5-yl)propan-2-yl acetate
- quercetin-3-glucoside
- (1r,3ar,7s,8ar)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1-methyl-4-methylidene-octahydroazulen-1-ol
- (1r,2r,4ar,8as)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalen-1-yl acetate
- (6r,8as)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-4,8a-dimethyl-1,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-one
- 2-[(3r,3ar,5r,8ar)-3-hydroxy-3-methyl-8-methylidene-octahydroazulen-5-yl]propan-2-yl acetate
- jaceosidin
- isoquercetin
- (1r,2r,4as,7s,8ar)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalene-1,7-diol
- 7-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-1-methylidene-octahydronaphthalen-2-ol
- (1r,4ar,7r,8s,8as)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalene-1,8-diol
- 2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalen-1-yl acetate
- (1r,2r,4ar,8as)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalen-1-ol
- (1s,2r,4as,7r,8s,8as)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalene-1,2,8-triol
- hispidulin
- quercetin
- (1s,2r,4as,7r)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a,8-dimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1h-naphthalene-1,7-diol
- 2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a,8-dimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1h-naphthalene-1,7-diol
- (1r,2r,4as,7r,8ar)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalene-1,7-diol
- (1s,2s,4as,7r,8s,8as)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalene-1,2,8-triol
- 7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1-methyl-4-methylidene-octahydroazulen-1-ol
- 6-(2-hydroxypropan-2-yl)-4,8a-dimethyl-1,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-one

ÄTHERISCHE ÖLE

- 8-hydroxy-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalen-1-yl acetate
- 2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalene-1,7-diol
- 7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalene-1,2,8-triol
- 2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a,8-dimethyl-6-oxo-1,2,3,4,5,8a-hexahydronaphthalen-1-yl acetate
- (1r,3ar,7r,8ar)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1-methyl-4-methylidene-octahydroazulen-1-ol
- 2-[(3r,3ar,5s,8ar)-3-hydroxy-3-methyl-8-methylidene-octahydroazulen-5-yl]propan-2-yl acetate
- 2-(3-hydroxy-3-methyl-8-methylidene-octahydroazulen-5-yl)propan-2-yl acetate
- (1r,3ar,7s,8ar)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1-methyl-4-methylidene-octahydroazulen-1-ol
- (1r,2r,4ar,8as)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalen-1-yl acetate
- (6r,8as)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-4,8a-dimethyl-1,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-one
- (1r,4ar,7r,8s,8as)-8-hydroxy-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyl-octahydronaphthalen-1-yl acetate
- 2-[(3r,3ar,5r,8ar)-3-hydroxy-3-methyl-8-methylidene-octahydroazulen-5-yl]propan-2-yl acetate
-
- (4ar,5r,6r,8as)-5-hydroxy-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-4,8a-dimethyl-1,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-one
- (1r,2r,4as,8ar)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a,8-dimethyl-6-oxo-1,2,3,4,5,8a-hexahydronaphthalen-1-yl acetate
- (1r,2r,4as,7s,8ar)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4a-methyl-8-methylidene-octahydronaphthalene-1,7-diol

IN DER KÜCHE

- Blätter können gekocht als Gemüse verzehrt werden
- Samen nach Einweichen in Wasser als Mehlersatz oder gekocht gegessen werden

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

mittel

GIFTIGE TEILE

- Blätter
- Samen

VERGIFTUNGSZEICHEN

Saponine können örtliche Reizungen verursachen.

NEBENWIRKUNGEN

- Verdauungsbeschwerden durch Saponine in großen Mengen

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

QUELLEN

- Typ: korpus · Datei: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim · Stand: 2026-01-15 · Titel: Klebriger Drüsengänsefuß · Felder: ['giftige_teile', 'vergiftungssymptome'] · Korpus: kiwix · Erfasst: 2026-09-03T07:41:50 · Hinweis: kiwix: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim (Stand 2026-01-15), Artikel «Klebriger Drüsengänsefuß» (gefunden über «Dysphania botrys») · Sprache: de