

Dicoma tomentosa

Asteraceae · Dicoma · Asterales · Magnoliopsida



WIRKUNG

Fever reduction, anti-inflammatory, hepatoprotective, antimicrobial, antioxidant.

ANWENDUNG

Getrocknetes Wurzelpulver: 1-2 g, 10-15 Min. ziehen lassen; Blätterttee: 2-3 g getrocknete Blätter wie grüner Tee aufgegossen; alkoholischer Extrakt als Tinktur: 1:5 w/v in 40 % Ethanol; äußerlicher Umschlag: frische Blätter zu einer Paste zerstoßen.

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Senkung von Fieber, Entzündungen, Leberschutz, antimikrobielle Wirkung, antioxidative Eigenschaften.

AYURVEDA

Freitext: Vata-pacifying (dry and cold) nature attributed to warming diterpene fraction

ÜBERLIEFERTES WISSEN

Khoisan-Frauen verwendeten Wurzelabkochungen zur Fiebersenkung, fruehe Zulu-Heiler legten Blattumschlaege auf Wunden, Aerzte der suedafrikanischen Armee beobachteten die Anwendung gegen malariaaehnliche Schuettelfroeste.

SIGNATURENLEHRE

Bitter schmeckende Pflanze mit Beziehung zum Element Feuer und der Sonne

ERKENNUNGSMERKMALE

Erect branching stems covered in fine hairs; small daisylike flower heads pale yellow to off-white.

WUCHS

Strauch

STANDORT

Well-drained, sandy soils

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Wurzeln, Blätter

ZUBEREITUNG

- Dried root powder
- Leaf tea
- Alkoholische Extrakt-Tinktur
- Topical poultice

ERNTZEIT

- Teil: Late season (March to May) for roots; pre-flowering for leaves

INHALTSSTOFFE

- Eupatin
- Hyperoside
- Eupatolitin
- Quercetin
- Diterpenoid lactones
- Kaurenoic acid derivatives
- Flavonols
- Germacrane sesquiterpenoids
- Sesquiterpene hydrocarbons

ÄTHERISCHE ÖLE

- [(3as,11ar)-6-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl]methyl acetate
- [6-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl]methyl acetate
- 4-hydroxy-10-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-6-carbaldehyde
- (3ar,4s,11ar)-4-hydroxy-10-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-6-carbaldehyde
- [(3ar,4s,11ar)-6-formyl-4-hydroxy-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl]methyl acetate
- {6-[(acetyloxy)methyl]-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl}methyl acetate
- [(3as,11as)-6-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl]methyl acetate
- [(3as,11ar)-6-formyl-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl]methyl acetate
- [(3as,11ar)-6-formyl-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl]methyl acetate
- [(3as,11ar)-10-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-6-yl]methyl acetate
- [10-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-6-yl]methyl acetate
- [(3as,11ar)-6-[(acetyloxy)methyl]-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl]methyl acetate
- {6-formyl-4-hydroxy-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl}methyl acetate

acetate

- {6-formyl-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-10-yl} methyl acetate
-

(3ar,4s,11ar)-4-hydroxy-10-(hydroxymethyl)-3-methylidene-2-oxo-3ah,4h,5h,8h,9h,11ah-cyclodeca[b]furan-6-carbaldehyde

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

NEBENWIRKUNGEN

Leichte Uebelkeit oder Durchfall bei Einnahme auf leeren Magen; selten Kontaktdermatitis durch die Blatthaare; leichter Blutdruckabfall bei empfindlichen Personen.

GEGENANZEIGEN

Schwangere oder stillende Frauen, Säuglinge sowie Patienten unter Antikoagulanzen sollten die Anwendung meiden, bis weitere Daten vorliegen.

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.