

Byrsonima spicata

Malpighiaceae · Byrsonima



ÜBER DIE PFLANZE

Bäume, Sträucher und Halbsträucher mit ganzrandigen Blättern, gelben Blüten und fleischigen, essbaren Früchten, die Nance genannt werden; hauptsächlich von oligolektischen einheimischen Bienen bestäubt. Elliptische oder lanzettliche Blätter (2 bis 4 Zoll lang und etwa 1 Zoll breit), in der Jugend behaart, im ausgereiften Zustand nahezu unbehaart. Kleine gelblich-goldene Blüten, die von Juni bis September in endständigen Trauben gebildet werden. Kugelige Früchte mit einem Durchmesser von bis zu 1 Zoll, die 3 Samen enthalten. Das saftige Fruchtfleisch ist zum Frischverzehr zu säuerlich, kann aber zur Herstellung von Gelee oder Konfitüre verwendet werden.

ERKENNUNGSMERKMALE

ganzrandige Blätter, gelbe Blüten, fleischige essbare Früchte, die Nance genannt werden; in der Jugend behaart, im ausgereiften Zustand nahezu unbehaart; kleine gelblich-goldene Blüten, die von Juni bis September in endständigen Trauben gebildet werden; kugelige Früchte mit einem Durchmesser von bis zu 1 Zoll, die 3 Samen enthalten

BLÜTEZEIT

- June until September

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Die Früchte können zur Herstellung von Gelee oder Konfitüre verwendet werden

ERNTENZEIT

- Teil: Frucht · Monate: [9, 10, 11, 12] · Hinweis: Globöse Früchte reifen im Herbst und Winter.

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.