

Polygala sibirica

Polygalaceae · Polygala · Fabales · Magnoliopsida

ERNTZEIT

• Teil: Wurzel · Monate: [10, 11] · Hinweis: Niedrigste Mondphase (Neumond oder späte Abendmondphase) · Mondphase: Neumond · Tageszeit: morgens · Bedingungen: Die aktiven Inhaltsstoffe sind im Spätherbst am höchsten.

INHALTSSTOFFE

- mangiferin
- lancerin
- tenuifoliside d
- tenuifoliside a
- 7-hydroxy-1-methoxyxanthen-9-one
- 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]xanthen-9-one
- 2-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
- 1,2,3,7-tetramethoxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]xanthen-9-one
- mangiferin
- 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]xanthen-9-one
- 1,3-dihydroxy-2,7-dimethoxy-6-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]xanthen-9-one
- 1,3,7-trihydroxy-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]xanthen-9-one

ÄTHERISCHE ÖLE

•

13-(chloromethyl)-2,3-dihydroxy-4,6a,11,11,14b-pentamethyl-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,13,14,14a-tetra decahydro-1h-picene-4,8a-dicarboxylic acid

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

GIFTIGE TEILE

- Wurzel

VERGIFTUNGSZEICHEN

raw Polygalae Radix kann die Kehle reizen und nach langer Nutzung oder zu hohen Dosen ein gewisses Maß an Toxizität für den Gastrointestinaltrakt aufweisen

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

QUELLEN

- Typ: primaer · Pmids: ['33069838'] · Titel: PubMed/MEDLINE · Felder: ['giftige_teile', 'toxizitaet_bewertet_am', 'toxizitaet_quelle', 'toxizitaet_stufe', 'vergiftungssymptome'] · Korpus: medline · Erfasst: 2026-09-04T14:59:49