

Sterculia urens

Malvaceae · Sterculia · Malvales · Magnoliopsida

WIRKUNG

Laxativ, Entzündungsunterdrückend, möglicherweise Aphrodisiakum (nicht bewiesen)

ANWENDUNG

Laxativ und als Dämpfungsmittel in Kosmetika und Medikamenten

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Entgiftung, Läuterung, Behandlung von Halsentzündungen und Dysenterie

AYURVEDA

Freitext: Sthaviryavardhaka Agent; demulcent action; postpartum care to ease constipation and replenish vital fluids

ÜBERLIEFERTES WISSEN

Verwendung in Ayurveda für über tausend Jahre, zur Erhöhung der Stärke und Unterstützung des Gewebeheilens; traditionelle Heiler verwenden es, um entzündete Hälsen zu beruhigen und Dysenterie zu behandeln

ERKENNUNGSMERKMALE

horizontale Zweige, rauhe graue Rinde, pinnate Blätter mit 5-7 ovalen Blättchen, kleine rothäutige Blüten in Gruppen während der trockenen Jahreszeit

WUCHS

Baum

BLÜTEZEIT

- trockene Jahreszeit

STANDORT

dürre felsigen Hügel in Zentral- und Nordindien (300–750 m), trockene und tropische Laubwälder

HERKUNFT

Indien, Indochina, Malaysia, Burma, Ostasien, Sri Lanka

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Gummi aus der Rinde, Samen als Nahrung

ZUBEREITUNG

- Gummi aus der Rinde, Samen geröstet verzehrt

ERNTENZEIT

- Teil: Barkexudat (Karaya gum) · Monate: [3, 5, 11] · Hinweis: Ernte erfolgt in trockenen Wintermonaten. · Bedingungen: 285 mg active substance of ethephon treatment, 4 hours after application, 15 days for initial collection, every 10 days thereafter
- Teil: Barkexudat (Karaya gum) · Monate: [2, 5] · Hinweis: Ernte erfolgt in trockenen Wintermonaten.

SAMMELN

- Hinweis: Make shallow 'V'-shaped cuts in the bark and collect exudate over several days. Manual tapping accompanied by local rituals invoking protective deities. · Tageszeit: morgens|abends|nach Tau · Bedingungen: trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Rinde · Reifezustand: vor Reife|reif|überreif
- Hinweis: Pay attention to the presence of its stinging hairs. · Bedingungen: trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Samen|Wurzel · Reifezustand: vor Reife, reif

INHALTSSTOFFE

-
- Galactomannan polysaccharides, sterculic and malvalic acids, scopoletin, tannins, polyphenols

IN DER KÜCHE

Samen als Nahrungsmittel, geröstet verzehrt

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

QUELLEN

• Typ: korpus · Datei: wikipedia_en_all_maxi_2026-02.zim · Stand: 2026-02-15 · Titel: Sterculia urens · Felder: ['anwendung'] · Korpus: kiwix · Erfasst: 2026-09-04T10:28:16 · Hinweis: kiwix: wikipedia_en_all_maxi_2026-02.zim (Stand 2026-02-15), Artikel «Sterculia urens» · Sprache: en