

# Uvaria dulcis

Annonaceae · Uvaria · Magnoliales · Magnoliopsida

## ANWENDUNG

Fieberbehandlung und zur Förderung der Milchbildung

## VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Pflanze

## ZUBEREITUNG

- Wasserdecoction

## INHALTSSTOFFE

- pronuciferine
- (9r)-15,16-dimethoxy-10-azatetracyclo[7.7.1.0<sup>2,7</sup>.0<sup>13,17</sup>]heptadeca-1(16),2,4,6,13(17),14-hexaene
- r-(-)-asimilobine
- 8-hydroxy-5,7-dimethoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
- anonaine
- anolobine
- chrysin
- 11-methyl-3,5-dioxa-11-azapentacyclo[10.7.1.0<sup>2,6</sup>.0<sup>8,20</sup>.0<sup>14,19</sup>]icosa-1(20),2(6),7,14,16,18-hexaene
- pinocembrine
- 1-(2,3-dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one
- pinocembrin
- (-)-reticuline
- benzyl benzoate
- 3-(4-methylphenyl)-n-(2-phenylethyl)prop-2-enimidic acid
- (2e)-1-(2,3-dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
- 1-(2,3-dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
- 3,8-dihydroxy-5,7-dimethoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
- reticuline
- (2s)-8-hydroxy-5,7-dimethoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
- (+,-)-reticuline
- (12bs)-3,11-dimethoxy-7,8,12b,13-tetrahydro-5h-6-azatetraphene-2,12-diol
- hordenine
- (2r,3r)-3,8-dihydroxy-5,7-dimethoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
- annonin i
- capaurine
- (2e)-3-(4-methylphenyl)-n-(2-phenylethyl)prop-2-enimidic acid

## SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

### WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

### QUELLEN

• Typ: korpus · Datei: wikipedia\_en\_all\_maxi\_2026-02.zim · Stand: 2026-02-15 · Titel: Uvaria dulcis · Felder: ['anwendung', 'pflanzenteil\_nutzung', 'zubereitungsformen'] · Korpus: kiwix · Erfasst: 2026-09-04T10:37:12 · Hinweis: kiwix: wikipedia\_en\_all\_maxi\_2026-02.zim (Stand 2026-02-15), Artikel «Uvaria dulcis» · Sprache: en