

Knäuelgras

Dactylis glomerata

Poaceae · Dactylis

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Blatt

ERNTENZEIT

- Teil: Samen · Monate: [6, 7, 8] · Tageszeit: 14:00 Uhr · Bedingungen: Hoher Zuckergehalt und hohe Trockenstoffgehalt (DM) im Heu, geringere Ammonium-Niveaus in der Silage.

SAMMELN

- Tageszeit: morgens|abends|nach Tau · Bedingungen: trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Gesamtpflanze · Reifezustand: vor Reife|reif|überreif|nach Frost

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

QUELLEN

- Typ: korpus · Datei: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim · Stand: 2026-01-15 · Titel: Gewöhnliches Knäuelgras · Felder: ['anwendung', 'dosierung_max', 'kontraindikationen', 'name_latein', 'nebenwirkungen', 'wirkung'] · Korpus: kiwix · Erfasst: 2026-10-04T10:10:13 · Hinweis: kiwix: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim (Stand 2026-01-15), Artikel «Gewöhnliches Knäuelgras» (gefunden über «Dactylis glomerata») · Sprache: de